

80

17

ס  
מספר 21

2

**בני 65+**  
**בישראל**  
**שנתון**  
**סטטיסטי**

פרק 2

מאירס-ג'וינט-ברוקדייל  
MYERS-JDC-BROOKDALE  
مايرس - جوينت - بروكديل



50  
ג'וינט ישראל אשל | JDC  
יחד בעשייה חברתית למען הזקנים

**פרק 2**  
**מאפיינים בריאותיים של בני 65+**  
**ודפוס שימוש בשירותי בריאות נבחרים**



## — לקט נתונים —

❖ תוחלת החיים, 2017

	גברים	נשים
בלידה	80.7	84.6
בגיל 65	19.2	21.6

❖ בני 65+ התופסים את מצב בריאותם כ"טוב" או "טוב מאד", 2017, אחוזים

	סה"כ	גברים	נשים
טוב	42.3	45.4	39.8
טוב מאוד	13.7	15.6	12.1

❖ אומדן בני 65+ שלהם קושי רב בביצוע פעולות שונות, 2017, אחוזים

	ללכת או לעלות במדרגות	לבצע להתלבש או להתרחץ משק בית
	30.2	12.6
		26.3

❖ בני 65+ המדווחים על קבלת חיסון נגד שפעת, 2017

60.8%

❖ אשפוזים של בני 65+ במחלקות כלליות, 2017

415

שיעורים ל-1,000 נפש

❖ סיבות פטירה עיקריות של בני 65+, 2016

23.1%

שאתות ממאירות

16.1%

מחלות לב

5.8%

מחלות של כלי דם במוח

5.7%

סוכרת

## 2. מאפיינים בריאותיים של בני 65+ ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



### מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של בני 65+ בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של בני 65+ אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאותם.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של בני 65+ ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של האדם. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של בני 65+ ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של בני 65+ בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

## ממצאים עיקריים

- ◆ **תוחלת החיים בלידה** הגיעה בשנת 2017 ל-84.6 שנים לנשים ול-80.7 שנים לגברים. תוחלת החיים של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת 2017 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 3.7 שנים לגברים ו-3 שנים לנשים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** בשנים 2013-2017 היא 21.6 שנים לנשים ו-19.2 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 86.6 בממוצע, וגבר – עד גיל 84.2. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 13.4 שנים ולגברים 11.9 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.4 שנים ושל נשים בנות 75 ב-4.2 שנים (לוח 2.3).
- ◆ ב-2016 עמד **שיעור הפטירה** המתוקנן לגיל ל-1,000 בני 65+ על 42 בקרב הגברים ועל 33 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקנן ל-1,000 בני 65+ בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים: 54 בקרב הגברים ו-42 בקרב הנשים (לוח 2.4).
- בשנת 2016 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי ישראל היה 36, בקרב ילידי אסיה 38, בקרב ילידי אפריקה 35 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 46. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי בריה"מ לשעבר הוא 41 (לוח 2.5).
- שישים ושישה אחוזים מבני 65+ **נפטרו בבית חולים** בשנת 2017, שיעור דומה לזה שבקרב בני 0-64 (65%) ובקרב כלל האוכלוסייה (65%). בקרב בני 65+ 68% מהגברים ו-64% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 61% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 71% מהנשים. יש לשים לב כי הנתונים אינם כוללים את כל בתי החולים למחלות ממושכות ולכן יתכן שהנתונים, במיוחד לגבי בני 65+, מוטים כלפי מטה (לוח 2.6).
- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני 65+ והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בקרב בני 65+ סיבות עיקריות נוספות הן מחלת לב איסכמית, מחלות של כלי דם במוח, מחלות זיהומיות וסוכרת (לוח 2.7).

- ב-2016 נפטרו 36,717 אנשים בגיל 65+, שהם 81% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. עם השנים חלקם של בני 65-74 בכלל הפטירות של בני 65+ הולך ופוחת. בשנת 2003 היה חלקם של בני 65-74 מתוך הפטירות של בני 65+ 23% לעומת 19% ב-2016 (לוח 2.9א ונתונים משנתונים קודמים).
- עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, מחלות אחרות של מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-18% בקרב בני 65-74 ל-30% בקרב בני 85+. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-38% בקרב בני 65-74 ל-15% בקרב בני 85+ (לוח 2.9א).
- ◆ בשנת 2015 נרשמו 52 **התאבדויות** של גברים בני 65 ומעלה ו-25 התאבדויות של נשים בנות 65 ומעלה. אחוז ההתאבדויות של בני 65+ מכלל ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ-31% ב-1981 ל-19% ב-2014 וב-2015 עמד על 23% (לוח 2.10).
- ◆ על פי הסקר החברתי, בשנים 2015-2017 56% מבני 65 ומעלה מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד**, לעומת 84% בקרב בני 20 ומעלה. בקרב בני 65+, 61% מהגברים ו-52% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 13% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב, לעומת 4% בקרב בני 20 ומעלה (לוח 2.11).
- ◆ על פי הסקר החברתי, בשנת 2017 49% מבני 65+ **עוסקים בפעילות גופנית**. מתוך בני 65+ העוסקים בפעילות גופנית, 79% עוסקים בפעילות גופנית מתונה ו-20% עוסקים בפעילות גופנית מאומצת. 29% עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק השרירים (לוח 2.12).
- ◆ **מדד מסת הגוף (BMI)** מחושב על-פי גובה ומשקל. ערכים שמעל 30 נחשבים להשמנת יתר. על פי הסקר החברתי של 2017 ל-17% בקרב כלל האוכלוסייה יש BMI של 30 ויותר (לפי דיווח עצמי על גובה ומשקל גוף). לעומת זאת, ל-23% מבני 65 ומעלה יש BMI של 30 ויותר. 24% מהנשים סובלות מהשמנת יתר, ו-22% מהגברים. בקרב הערבים 36% סובלים מהשמנת יתר

לעומת 22% בקרב יהודים ואחרים. אחוז הנשים הערביות הסובלות מהשמנת יתר גבוה במיוחד, 41% (לוח 2.13).

◆ על פי הסקר החברתי של 2017 11% מהקשישים **מעשנים** כיום, בתדירות כלשהי, לעומת 23% בכלל האוכלוסייה. אחוז המעשנים בקרב הגברים בני 65+, כפול מאחוז הנשים בנות 65+ המעשנות (15% לעומת 8%). 36% מבני 65+ עישנו בעבר והפסיקו. מבין המעשנים שהפסיקו 31% עשו זאת בגיל 60 ומעלה (לוח 2.14).

◆ על פי הסקר החברתי, בשנת 2017 54% מבני 65 ומעלה מדווחים על **קושי כלשהו להירדם** או לישון במשך לילה שלם לעומת 40% בקרב כלל האוכלוסייה. 50% אחוזים מבני 65-74 מדווחים על קושי מסוג זה ו-61% מבני 75+. מבין אלה שדיווחו על בעיות שינה 72% מבני 65+ ו-70% מכלל האוכלוסייה דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום (לוח 2.15).

◆ בשנת 2016 נרשמו 16,421 **מקרים חדשים של שאתות ממאירות** בקרב בני 65+, אשר מהווים 1,679 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים בכלל האוכלוסייה הוא 353 לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים בני 65+ גבוה יותר מאשר בקרב הנשים בנות 65+ (1,931 לעומת 1,478 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.16).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים: 2,309 לעומת 2,062 לכל 100,000 נפש. גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 468\1 לעומת 995 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.17). בשנת 2016 שיעור המקרים החדשים בקרב יהודים ילידי אירופה-אמריקה היה גבוה מאשר בקרב יהודים ילידי אסיה, אפריקה או ישראל, בקרב גברים ונשים (לוח 2.18).

◆ לפי נתוני הסקר החברתי, בשנת 2017 אומדן בני 65+ הגרים בקהילה ומוגבלים **בביצוע** (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע) פעולות הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד על 253 אלף איש והם מהווים 26% מבני 65+ הגרים בקהילה. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 17% בקרב בני 65-74 לעומת 41% בקרב בני 75+. מספרם של בני 65+ המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב-291 אלף איש (30% מבני 65+ הגרים בקהילה). שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 65-74 עומד על 21% ובקרב בני 75+ על 44%. מספר בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב-121 אלף איש והם מהווים 13% מבני 65+ הגרים בקהילה (7% בקרב בני 65-74 ו-21% בקרב בני 75+). 71 אלף איש מוגבלים בראייה ו-86 אלף איש בשמיעה בקרב בני 65+ (7% ו-9% בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב הערבים לעומת היהודים ואחרים. למשל, 54% בקרב הערבים מוגבלים בביצוע פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 24% בקרב יהודים ואחרים (לוח 2.20).

◆ בשנת 2017 נפגעו **בתאונות דרכים** 2,367 בני 65+. מתוכם, 92 נהרגו (4% מבני 65+ שנפגעו), 441 נפצעו קשה (19%) ו-1,834 נפצעו קל (77%). בהשוואה לנתוני 2016 עלה מספרם המוחלט של בני 65+ שנפגעו, עלה חלקם של ההרוגים והפצועים קשה וירד חלקם של הפצועים קל. 33% מבני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 42% נהגו ברכב ו-21% נסעו ברכב (לוח 2.21 ונתונים משנתונים קודמים).

- שיעור בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2016 נמוך מזה שבקרב כלל האוכלוסייה (237 ו-265 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך **שיעור ההרוגים** בקרב בני 65+ גבוה מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה (9 ו-4 ל-100,000 נפש בהתאמה). שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני 65+ (לוח 2.22). שיעור בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים ושיעור ההרוגים מתוכם היו בתהליך ירידה מאז שנות התשעים ובעשור האחרון נמצאים במגמה לא אחידה (לוח 2.23).



- **שיעור הנהגים בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2017** הוא 47 ל-10,000 נהגים לעומת 52 בכלל האוכלוסייה. בסה"כ היו 2,357 נהגים בני 65+ מעורבים בתאונות מתוכן 57 תאונות קטלניות (כ-2% מהתאונות); (לוח 2.24).

◆ לפי הסקר החברתי של 2017 92% מהנשים בנות 65+ עשו בדיקת ממוגרפיה, מהן 41% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה. 52% מהנשים בנות 65+ עשו בדיקת צוואר הרחם, 19% מהן בשנה האחרונה. 72% מבני 65+ עשו בדיקת דם סמוי, לעומת 52% מבני 40 ומעלה. 58% מבני 65+ עשו בדיקת קולונסקופייה, 60% מהגברים ו-56% מהנשים (לוח 2.25).

◆ לפי הסקר החברתי, בשנת 2017, 61% מבני 65+ קיבלו חיסון נגד שפעת, 63% מהגברים ו-59% מהנשים. עם העלייה בגיל עולה שיעור מקבלי החיסון: 58% בקרב בני 65-74 לעומת 65% בקרב בני 75+. בקרב כלל האוכלוסייה (בני 20+) 26% קיבלו חיסון נגד שפעת (לוח 2.26).

◆ מתוך כלל הביקורים במחלקות לרפואה דחופה (חדרי מיון) בשנת 2017, 22% היו של בני 65+. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 419 בקרב בני 65-74; 703 בקרב בני 75-84; 1,054 בקרב בני 85+ לעומת 297 בקרב כלל האוכלוסייה. 22% מהביקורים של בני 65+ היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) לעומת 17% ביקורים חוזרים בקרב כלל האוכלוסייה (לוח 2.27).

◆ **שיעורי האשפוז של בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה.** בשנת 2017 נרשמו 415 אשפוזים ל-1,000 בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות, לעומת 134 ל-1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-304 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-716 בגיל 85+). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי האשפוז של בני 65+ במגמת ירידה (לוח 2.28).

- **בבחינת שיעור אשפוז בני 65+ מכלל האשפוזים נמצא כי בשנת 2016 35% מהאשפוזים היו של בני 65+ (המהווים כ-11% מכלל האוכלוסייה), ו-21% מהאשפוזים היו של בני 75+ (המהווים כ-5% מכלל**

האוכלוסייה); (לוח 2.29). חלקם של בני 65+ מתוך כלל האשפוזים במחלקות פנימית, טיפול נמרץ נשימתי, עיניים וכירורגייה כלי דם גבוה במיוחד (ללא גריאטרייה); (לוח 2.30).

- התפלגות האשפוזים של בני 65+ במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה 46% מהאשפוזים (לוח 2.31).

- השהייה הממוצעת של בני 65+ בכלל המחלקות הכלליות בשנת 2017 הייתה 5.2 ימים לעומת 4 ימים בקרב כלל האוכלוסייה. המחלקות שבהן משך השהייה של בני 65+ הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם, גריאטרייה חריפה, עור ומין, ואונקולוגיה (לוח 2.32).

♦ בשנת 2017 קיבלו 5,341 בני 65+ (פחות מ-1% מקרב בני 65+) טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי. בני 65+ מהווים 12% מכלל המטופלים בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי ב-2017 (לוח 2.33).

♦ ב-2017 היו 17 בני 65+ באשפוז יום פסיכיאטרי, והם היוו 8% מסך השוהים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי. כמעט כל המאושפזים באשפוז יום הם בני 65-74: 94% מכלל בני 65+ השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.34).

♦ בסוף 2017 היו 345 בני 65+ מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 0.3 מאושפזים ל-1,000 נפש (שיעור דומה לשיעור המאושפזים בקרב כלל האוכלוסייה). עשרה אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.35). משנת 1990 ועד שנת 2017 חלה ירידה בשיעור בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.3 ל-1,000 נפש); (לוח 2.36).

- במהלך 2017 היו 2,072 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+, ואלה היוו 9% מסך הקבלות לאשפוז. 54% מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (69% מכלל האשפוזים של בני 65+); (לוח 2.37). שתי האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (76% מהקבלות) היו: סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות, והפרעות אפקטיביות (לוח 2.38).

- 10% מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא בשנת 2017 היו של בני 65+ (לוח 2.39).

♦ בנובמבר שנת 2017 היו 60% מבני 65+ מבוטחים בשירותי בריאות כללית (לעומת 52% מכלל האוכלוסייה), 23% במכבי שירותי בריאות (לעומת 25% מכלל האוכלוסייה), 7% בקופת חולים לאומית ו-10% בקופת חולים מאוחדת (לעומת 8% ו-14% מכלל האוכלוסייה בהתאמה). יש ירידה לאורך השנים באחוז בני 65+ המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 69% בקרב בני 85 ומעלה (לוח 2.40). 14% מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני 65+, 11% במכבי שירותי בריאות, 10% בקופת חולים לאומית ו-8% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.41).

## הגדרות והסברים

**כלל האוכלוסייה:** המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

**קבוצות אוכלוסייה ודת:** החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "ערבים" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

**תמותה:** הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ. עד שנת 2002 לא נכללו מקרי מוות של

ישראלים ששהו בחו"ל. החל מ-2002 נכללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל פחות משנה.

**תוחלת החיים** בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

**אומדני המוגבלות** בקרב בני +65 הגרים בקהילה, מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנים 2015-2017 בסקר החברתי שנערך על ידי הלמ"ס.

**רישום השאתות הממאירות** נעשה על ידי הרישום הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות וכולל גם גידולים ממוקדים וחודרניים.

**דמנציה:** הנתונים על שכיחות דמנציה באוכלוסייה מבוססים על 'סקר הימצאות' שנעשה על ידי המרכז הארצי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות, כחלק מפעולות התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן. הסקר נערך על ידי שליפת נתונים מהתיק הרפואי הממוחשב של מבוטחי קופה פעילים בשנת 2016, בני 45 ומעלה, בארבע קופות החולים, לפי 'הגדרת מקרה', על בסיס תיעוד של אבחנה או של רכישת תרופות הנמצא בתיק הרפואי. מבוטח הוגדר כחולה בדמנציה (אי-פעם) אם ענה לפחות על אחד משלושת התנאים האלה: 1. קיים בתיקו תיעוד אבחנה של דמנציה מתוך רשימת האבחנות הקבועות / פעילות / כרוניות לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9; 2. רופא מומחה (משפחה / פנימי / גריאטר / פסיכיאטר / נוירולוג) תיעד בתיקו קוד אבחנה של דמנציה לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9, בלפחות שתי אבחנות ביקור בתקופה של עד 12 חודשים (לצורך הגדרה כחולה, שני הביקורים יכולים להיות אצל רופאים שונים); 3. המבוטח רכש אי-פעם תרופות כנגד דמנציה.

שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-25%-50%. בהתאם לכך ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. משרד הבריאות עומד לפרסם דו"ח מלא בנושא זה בקרוב. לפרטים ראו ברשימת הביבליוגרפיה.

**אשפוז במחלקות כלליות:** הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

**מספר האשפוזים במחלקה** מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

**ימי אשפוז** הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

**שהייה ממוצעת** היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

### **אשפוז פסיכיאטרי**

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

**אשפוז פסיכיאטרי:** אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתל מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

**אשפוז מלא:** מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

**אשפוז יום:** מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

**קבלות:** קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

**קבלות ראשונות:** קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

**סך-כל הקבלות לאשפוז** כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

### סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים  
 .. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-30%  
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 15% ל-30%

### עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

### מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומכון מאירס-גוינט-ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

**לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות**

שנה	כלל האוכלוסייה		יהודים		בני דתות אחרות	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1965			70.5	73.2		
1970			69.8	73.3		
1975	70.3	73.9	70.9	74.5	68.2	71.5
1980	72.1	75.7	72.5	76.2	70.0	73.4
1985	73.5	77.0	73.9	77.3	72.0	75.8
1990	74.9	78.4	75.3	78.9	73.3	75.9
1995	75.5	79.5	75.9	79.8	73.8	77.3
שנה	כלל האוכלוסייה		יהודים ואחרים*		ערבים	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
2000	76.7	80.9	77.1	81.2	74.6	77.9
2001	77.3	81.2	77.7	81.6	74.5	77.8
2002	77.5	81.5	77.9	81.9	74.7	77.9
2003	77.6	81.8	78.1	82.2	74.9	78.2
2004	78.0	82.4	78.5	82.7	75.4	79.6
2005	78.2	82.2	78.7	82.6	74.9	78.6
2006	78.7	82.5	79.2	83.0	75.1	78.5
2007	78.7	82.4	79.2	82.8	75.2	78.8
2008	79.0	83.0	79.5	83.3	75.7	79.6
2009	79.6	83.3	80.1	83.7	76.4	80.8
2010	79.7	83.6	80.3	83.9	76.6	81.3
2011	79.9	83.5	80.5	83.8	76.4	81.0
2012	79.9	83.6	80.4	84.0	76.9	80.7
2013	80.3	83.9	80.7	84.3	78.0	80.9
2014	80.3	84.1	80.9	84.5	76.8	81.2
2015	80.1	84.1	80.7	84.5	76.9	81.1
2016	80.7	84.2	81.3	84.7	77.2	81.3
<b>2017</b>	<b>80.7</b>	<b>84.6</b>	<b>81.2</b>	<b>85.0</b>	<b>77.5</b>	<b>82.0</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

## לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

שנים	כלל האוכלוסייה		יהודים		ערבים*	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1979-1975	14.1	15.6	14.1	15.6	14.4	15.1
1984-1980	14.6	16.0	14.6	16.0	14.7	15.4
1989-1985	15.2	16.8	15.1	16.8	15.8	16.1
1994-1990	15.8	17.8	15.8	17.9	16.0	16.4
1999-1995	16.4	18.5	16.4	18.6	16.6	17.2
2004-2000	17.5	19.7	17.7	19.8	16.0	17.2
2009-2005	18.4	20.5	18.6	20.7	16.1	17.8
2014-2010	19.0	21.2	19.3	21.4	17.0	19.1
<b>2017-2013</b>	<b>19.2</b>	<b>21.6</b>	<b>19.5</b>	<b>21.8</b>	<b>17.2</b>	<b>19.4</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי  
\* עד 1995, בני דתות אחרות



### לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

שנים	בגיל 75		בגיל 80		בגיל 85		בגיל 95	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1979-1975	8.5	9.2	6.5	6.9	4.9	5.1		
1984-1980	8.7	9.3	6.6	6.8	4.6	4.9		
1989-1985	9.2	10.0	6.7	7.4	5.0	5.4		
1994-1990	9.6	10.7	7.3	8.0	5.4	5.8		
1999-1995	10.1	11.1	7.5	8.1	5.6	5.8		
2004-2000	11.0	12.1	8.5	9.0	6.5	6.5		
2009-2005	11.5	12.6	8.7	9.4	6.6	6.8		
2014-2010	11.8	13.1	8.8	9.6	6.7	7.2	3.4	3.3
<b>2017-2013</b>	<b>11.9</b>	<b>13.4</b>	<b>8.8</b>	<b>9.8</b>				

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

### לוח 2.4: פטירות של בני 65+, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2016

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

גיל	סה"כ			יהודים ואחרים <sup>(1)</sup>			ערבים		
	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ
<b>בני 65+</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>36</b>
בני 65-69	10	13	8	10	13	7	14	18	11
בני 70-74	17	22	13	16	20	12	28	34	24
<b>בני 75+</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>69</b>
בני 75-79	30	37	24	28	35	23	48	59	40
בני 80-84	56	62	51	54	61	50	74	80	70
<b>בני 85+</b>	<b>139</b>	<b>144</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>143</b>	<b>137</b>	<b>141</b>	<b>151</b>	<b>134</b>
בני 85-89	103	112	97	102	111	96	119	126	115
בני 90-95	181	184	179	181	184	179	179	191	172
<b>בני 95+</b>	<b>254</b>	<b>240</b>	<b>264</b>	<b>259</b>	<b>242</b>	<b>270</b>	<b>188</b>	<b>215</b>	<b>167</b>
שיעורים מתוקננים לבני 65+ <sup>(2)</sup>	38	42	33	37	41	33	48	54	42

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל בשנת 2016

**לוח 2.5: פטירות של יהודים ואחרים<sup>(1)</sup> בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2016**

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

	בני 75+			בני 65-74			65+	מאפיינים
	80+	79-75	סה"כ	74-70	69-65	סה"כ		
	103	33	74	19	11	14	<b>41</b>	<b>סה"כ</b>
	107	41	79	25	15	18	<b>43</b>	גברים
	100	27	71	15	8	11	<b>39</b>	נשים
	118	45	80	27	13	18	<b>36</b>	<b>סה"כ ילידי ישראל<sup>(2)</sup></b>
	125	55	87	32	16	21	<b>40</b>	גברים
	113	36	75	23	10	14	<b>33</b>	נשים
	89	28	64	16	10	13	<b>38</b>	<b>סה"כ ילידי אסיה</b>
	97	34	69	20	13	16	<b>41</b>	גברים
	84	23	60	11	7	9	<b>35</b>	נשים
	92	29	64	18	10	14	<b>35</b>	<b>סה"כ ילידי אפריקה</b>
	95	38	69	24	13	18	<b>38</b>	גברים
	90	22	60	13	8	10	<b>32</b>	נשים
	106	30	79	16	11	13	<b>46</b>	<b>סה"כ ילידי אירופה-אמריקה</b>
	110	38	82	22	14	17	<b>48</b>	גברים
	104	25	77	12	8	9	<b>45</b>	נשים
	99	30	67	18	12	14	<b>41</b>	<b>מזה: עולי בריה"מ לשעבר<sup>(3)</sup></b>
	103	41	72	25	17	20	<b>45</b>	גברים
	97	24	64	13	8	9	<b>38</b>	נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.6: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים\*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות**

אחוזים			
מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>2010</b>			
<b>בני 65+</b>	<b>68.2</b>	<b>69.7</b>	<b>66.9</b>
בני 74-65	71.5	70.8	72.2
בני 75+	67.5	69.4	66.0
בני 64-0	62.7	58.0	70.4
כלל האוכלוסייה	67.1	66.7	67.5
<b>2015</b>			
<b>בני 65+</b>	<b>66.3</b>	<b>68.4</b>	<b>64.4</b>
בני 74-65	70.8	70.0	72.0
בני 75+	65.3	67.9	63.1
בני 64-0	65.0	61.6	70.9
כלל האוכלוסייה	66.1	66.8	65.3
<b>2016</b>			
<b>בני 65+</b>	<b>65.9</b>	<b>68.3</b>	<b>63.9</b>
בני 74-65	69.6	69.2	70.2
בני 75+	65.0	67.9	62.8
בני 64-0	65.4	61.1	72.4
כלל האוכלוסייה	65.8	66.6	65.1
<b>2017</b>			
<b>בני 65+</b>	<b>65.6</b>	<b>67.6</b>	<b>63.6</b>
בני 74-65	69.7	69.6	69.9
בני 75+	64.5	66.9	62.5
בני 64-0	64.6	60.8	71.0
כלל האוכלוסייה	65.4	66.1	64.7

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות \* חלק מבתי החולים למחלות ממושכות לא נכללו בלוח. לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

**לוח 2.7: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2016**

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני 65+			סיבות פטירה
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
516	513	512	3,575	3,916	3,726	סה"כ*
31	29	30	225	250	236	מחלות זיהומיות
128	132	129	760	987	860	שאתות ממאירות
28	26	27	207	218	212	סוכרת
15	9	12	117	80	101	יתר לחץ-דם
13	15	14	101	121	110	אוטם חריף של שריר הלב
26	36	30	198	314	250	מחלת לב איסכמית אחרת
35	26	30	263	213	241	מחלות לב אחרות
29	24	26	217	212	215	מחלות של כלי דם במוח
5	6	5	35	44	39	מחלות אחרות של מחזור הדם
14	13	13	107	119	112	דלקת ריאות
13	16	14	97	131	112	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
12	12	12	93	108	99	יתר מחלות מערכת הנשימה
5	5	5	28	32	30	מחלות כבד
19	20	19	145	179	160	מחלות כליה
3	3	3	0	0	0	מומים מולדים
27	34	30	173	185	178	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
100	75	87	734	611	679	כל המחלות האחרות
2	7	5	6	17	11	תאונות דרכים
2	8	5	2	17	8	פגיעה עצמית מכוונת
10	14	12	66	77	71	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

**לוח 2.8: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2016**

שיעורים ל-100,000 נפש

סיבות פטירה	נשים			גברים		
	85+	84-75	74-65	85+	84-75	74-65
<b>סה"כ*</b>	<b>13,582</b>	<b>3,542</b>	<b>969</b>	<b>14,312</b>	<b>4,713</b>	<b>1,637</b>
מחלות זיהומיות	879	225	54	996	316	82
שאתות ממאירות	1,786	892	414	2,365	1,305	578
סוכרת	748	230	52	674	281	104
יתר לחץ-דם	557	97	13	366	82	28
אוטם חריף של שריר הלב	458	78	20	546	117	47
מחלת לב איסכמית אחרת	919	176	22	1,430	339	100
מחלות לב אחרות	1,137	252	40	954	236	67
מחלות של כלי דם במוח	901	222	36	805	259	81
מחלות אחרות של מחזור הדם	149	31	8	162	51	20
דלקת ריאות	493	97	12	603	131	25
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	333	104	31	399	187	54
יתר מחלות מערכת הנשימה	382	94	16	487	125	31
מחלות כבד	40	47	15	53	42	23
מחלות כליה	589	132	37	739	223	56
מומים מולדים	0	0	0	0	0	0
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	698	155	45	652	188	100
כל המחלות האחרות	3,227	644	133	2,692	709	186
תאונות דרכים	0	12	5	29	21	14
פגיעה עצמית מכוונת	0	0	3	29	16	16
כל הסיבות החיצוניות האחרות	282	55	17	329	87	26

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9א: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה,  
לפי גיל, 2016

קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה	סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	65+		
16,837	11,943	6,937	35,717	43,964	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
6.7	6.5	5.2	6.3	5.8	מחלות זיהומיות
14.5	26.4	38.3	23.1	25.2	שאתות ממאירות
5.2	6.2	6.0	5.7	5.2	סוכרת
3.5	2.2	1.6	2.7	2.4	יתר לחץ-דם
3.5	2.3	2.5	2.9	2.7	אוטם חריף של שריר הלב
8.0	6.1	4.6	6.7	5.9	מחלת לב איסכמית אחרת
7.7	6.1	4.1	6.5	5.9	מחלות לב אחרות
6.2	5.9	4.4	5.8	5.2	מחלות של כלי דם במוח
1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	מחלות אחרות של מחזור הדם
3.9	2.7	1.4	3.0	2.6	דלקת ריאות
2.6	3.4	3.3	3.0	2.8	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.0	2.7	1.8	2.7	2.4	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.3	1.1	1.5	0.8	0.9	מחלות כבד
4.7	4.2	3.6	4.3	3.8	מחלות כליה
0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	מומים מולדים
4.9	4.2	5.5	4.8	5.8	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
21.8	16.6	12.3	18.2	17.0	כל המחלות האחרות
0.1	0.4	0.7	0.3	0.9	תאונות דרכים
0.1	0.2	0.7	0.2	0.9	פגיעה עצמית מכוונת
2.2	1.7	1.6	1.9	2.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי  
\* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2016

קבוצת גיל				כלל הגברים	סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	65+		
6,524	5,960	4,131	16,615	21,731	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
7.0	6.7	5.0	6.4	5.7	מחלות זיהומיות
16.5	27.7	35.3	25.2	25.7	שאתות ממאירות
4.7	6.0	6.3	5.6	5.0	סוכרת
2.6	1.7	1.7	2.1	1.8	יתר לחץ-דם
3.8	2.5	2.9	3.1	3.0	אוטם חריף של שריר הלב
10.0	7.2	6.1	8.0	7.0	מחלת לב איסכמית אחרת
6.7	5.0	4.1	5.4	5.0	מחלות לב אחרות
5.6	5.5	5.0	5.4	4.7	מחלות של כלי דם במוח
1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	מחלות אחרות של מחזור הדם
4.2	2.8	1.5	3.0	2.6	דלקת ריאות
2.8	4.0	3.3	3.3	3.0	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.4	2.7	1.9	2.8	2.4	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.4	0.9	1.4	0.8	1.0	מחלות כבד
5.2	4.7	3.4	4.6	3.9	מחלות כליה
0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	מומים מולדים
4.6	4.0	6.1	4.7	6.6	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
18.8	15.0	11.3	15.6	14.7	כל המחלות האחרות
(0.2)	0.4	0.8	0.4	1.4	תאונות דרכים
(0.2)	0.3	0.9	0.4	1.5	פגיעה עצמית מכוונת
2.3	1.8	1.6	2.0	2.8	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9ג: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות 65+ ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2016

	קבוצת גיל				כלל הנשים	סיבות פטירה
	85+	84-75	74-65	65+		
	10,313	5,983	2,806	19,102	22,233	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
	6.5	6.4	5.5	6.3	5.9	מחלות זיהומיות
	13.1	25.2	42.7	21.2	24.7	שאתות ממאירות
	5.5	6.5	5.4	5.8	5.4	סוכרת
	4.1	2.7	1.4	3.3	2.9	יתר לחץ-דם
	3.4	2.2	2.1	2.8	2.5	אוטם חריף של שריר הלב
	6.8	5.0	2.2	5.5	4.9	מחלת לב איסכמית אחרת
	8.4	7.1	4.1	7.4	6.7	מחלות לב אחרות
	6.6	6.3	3.7	6.1	5.6	מחלות של כלי דם במוח
	1.1	0.9	0.8	1.0	0.9	מחלות אחרות של מחזור הדם
	3.6	2.7	1.2	3.0	2.7	דלקת ריאות
	2.5	2.9	3.2	2.7	2.5	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
	2.8	2.7	1.7	2.6	2.4	יתר מחלות מערכת הנשימה
	0.3	1.3	1.5	0.8	0.9	מחלות כבד
	4.3	3.7	3.8	4.1	3.7	מחלות כליה
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	מומים מולדים
	5.1	4.4	4.6	4.8	5.1	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
	23.8	18.2	13.7	20.5	19.3	כל המחלות האחרות
	(0.0)	(0.3)	0.5	0.2	0.4	תאונות דרכים
	(0.0)	(0.0)	(0.3)	0.0	0.3	פגיעה עצמית מכוונת
	2.1	1.6	1.7	1.9	1.9	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי \* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות



**לוח 2.10: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות**

שנה	65+		74-65		75+		כלל האוכלוסייה	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1981	34	31	24	22	10	9	132	79
1990	59	26	30	14	29	12	220	84
2000	58	28	19	15	39	13	307	87
2005	55	33	20	10	35	23	304	121
2010	73	23	33	14	40	9	394	86
2011	72	15	28	8	44	7	322	87
2012	66	20	31	11	35	9	354	81
2013	53	20	19	8	34	12	291	81
2014	50	21	18	10	32	11	294	88
2015	52	25	22	11	30	14	269	73

**אחוזים מכלל ההתאבדויות**

שנה	64-0	74-65	75+	סה"כ	65+
1981	69.2	21.8	9.0	100.0	30.8
1990	72.0	14.5	13.5	100.0	28.0
2000	78.2	8.6	13.2	100.0	21.8
2005	79.3	7.1	13.6	100.0	20.7
2010	80.0	9.8	10.2	100.0	20.0
2011	78.7	8.8	12.5	100.0	21.3
2012	80.2	9.7	10.1	100.0	19.8
2013	80.4	7.3	12.4	100.0	19.6
2014	81.4	7.3	11.3	100.0	18.6
2015	77.5	9.6	12.9	100.0	22.5

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.11: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, 2015-2017

אחוזים			
מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
טוב מאוד	13.7	15.6	12.1
טוב	42.3	45.4	39.8
לא כל כך טוב	30.6	27.3	33.3
בכלל לא טוב	13.4	11.7	14.8
<b>כלל האוכלוסייה*</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
טוב מאוד	53.0	55.0	51.2
טוב	31.0	30.7	31.3
לא כל כך טוב	11.7	10.2	13.1
בכלל לא טוב	4.3	4.1	4.5
<b>דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל</b>			
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>56.0</b>	<b>61.0</b>	<b>51.9</b>
<b>גיל</b>			
74-65	64.8	68.9	61.3
75+	42.1	47.6	38.1
<b>כלל האוכלוסייה*</b>	<b>84.0</b>	<b>85.7</b>	<b>82.5</b>

מקור: למ"ס, הסקר החברתי \* אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

**לוח 2.12: בני 65+ וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג פעילות, גיל ומין, 2017**

אחוזים		
נשים	גברים	סה"כ
<b>עוסקים בפעילות גופנית<sup>(1)</sup></b>		
<b>סה"כ בני 65+</b>		
48.7	50.1	49.3
74-65		
52.0	53.8	52.8
75+		
43.7	43.6	43.7
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>		
48.3	54.6	51.4
<b>עוסקים בפעילות גופנית מאומצת (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)<sup>(3)</sup></b>		
<b>סה"כ בני 65+</b>		
15.8	25.9	20.4
74-65		
(19.9)	33.0	26.1
75+		
(8.2)	(10.6)	(9.2)
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>		
41.3	57.7	49.7
<b>עוסקים בפעילות גופנית מתונה (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)<sup>(4)</sup></b>		
<b>סה"כ בני 65+</b>		
77.5	81.0	79.1
74-65		
80.2	79.3	79.8
75+		
72.7	84.8	77.9
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>		
72.6	66.1	69.2
<b>עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק שרירים (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)<sup>(5)</sup></b>		
<b>סה"כ בני 65+</b>		
32.7	25.5	29.4
74-65		
29.5	25.3	27.5
75+		
38.4	(25.9)	33.0
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>		
35.4	35.7	35.6

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בשלושה החודשים שקדמו לראיון
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+
3. פעילות מאומצת היא פעילות הגורמת להזעה רבה ולעלייה רבה בקצב פעימות הלב, לדוגמה, ריצה, הליכה מהירה, פעילות אירובית. הכוונה לפעילות שנמשכה לפחות 10 דקות ברצף
4. פעילות מתונה היא פעילות הגורמת להזעה קלה ולעלייה מועטה בקצב פעימות הלב, לדוגמה, הליכה, רכיבה על אופניים, שחייה, באופן מתון. הכוונה לפעילות שנמשכה לפחות 10 דקות ברצף
5. פעילות לחיזוק שרירים היא פעילות המיועדת לחיזוק ובניית שרירי הגוף, לדוגמה התעמלות, עיצוב גוף, הרמת משקולות

**לוח 2.13: בני 65+ וכלל האוכלוסייה לפי מדד BMI<sup>(1)</sup>, גיל ומין, 2017**

אחוזים

מאפיינים	בני 65+			כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>
	נשים	גברים	סה"כ	
<b>סה"כ</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
תת משקל (עד 18.4)	..	..	1.3	3.5
משקל תקין (18.5 עד 24.9)	33.3	34.4	33.9	45.3
משקל עודף (25 עד 29.9)	40.8	42.7	41.7	34.6
השמנה (30 עד 34.9)	16.8	16.6	16.7	12.5
השמנת יתר (35 ומעלה)	7.6	5.0	6.4	4.2
<b>סובלים מהשמנה (BMI 30 ומעלה)</b>				
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>24.4</b>	<b>21.6</b>	<b>23.1</b>	
<b>גיל</b>				
74-65	23.9	22.3	23.1	
75+	25.3	20.4	23.1	
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>				
יהודים ואחרים	23.1	20.6	21.9	
ערבים	40.8	(32.5)	36.4	
<b>כלל האוכלוסייה<sup>(2)</sup></b>	<b>16.4</b>	<b>17.0</b>	<b>16.7</b>	

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. מדד BMI לבדיקת יחס גובה ומשקל, נקבע באמצעות חלוקת משקל הגוף (בק"ג) בגובה (במטר) בריבוע. נתוני גובה ומשקל בסקר החברתי הם לפי דיווח עצמי של המרואיינים
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

**לוח 2.14: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המעשנים, לפי גיל ומין, 2017**

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מעשנים כיום (כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת, נרגילה, בכל תדירות שהיא)	11.6	16.1	8.1
<b>מעשנים סיגריות לפחות פעם אחת ביום</b>	<b>11.0</b>	<b>14.8</b>	<b>7.9</b>
מעשנים לפי מספר הסיגריות ביום <sup>(1)</sup>			
סה"כ	100.0	100.0	100.0
עד 5	(19.7)	(15.7)	(25.8)
6-10	(27.7)	(22.3)	(36.1)
11-20	36.2	(39.6)	(31.1)
יותר מ-20	(16.4)	(22.4)	..
עישנו בעבר והפסיקו (מאלה שלא מעשנים היום)	36.0	56.3	20.5
גיל הפסקת עישון (מתוך אלו שעישנו בעבר והפסיקו)			
סה"כ	100.0	100.0	100.0
עד 19	..	..	..
20-29	(8.5)	(7.4)	(10.7)
30-39	17.6	19.3	(14.2)
40-49	21.2	22.3	(19.0)
50-59	21.0	21.4	(20.2)
60 ומעלה	31.0	28.6	36.0
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup> המעשנים כיום (כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת, נרגילה)	23.2	31.6	15.2
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup> המעשנים סיגריות לפחות פעם אחת ביום	22.1	30.1	14.7

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בקרב מעשנים כיום

2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.15: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה<sup>(1)</sup>, לפי גיל ומין, 2017

אחוזים

מאפיינים	בני 65+			כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>
	נשים	גברים	סה"כ	
<b>דיווחו על קושי להירדם או לישון במשך לילה שלם</b>				
<b>סה"כ</b>	100.0	100.0	100.0	100.0
בכל לילה או כמעט בכל לילה	15.1	23.2	27.8	
פעמיים - שלוש בשבוע	11.1	10.1	13.6	
פעם בשבוע או פחות	13.7	11.4	12.9	
לא היה קושי	60.1	55.3	45.7	
<b>דיווחו על קושי כלשהו להירדם או לישון במשך לילה שלם</b>				
<b>סה"כ</b>	39.9	44.7	54.3	
74-65	56.9	42.8	50.3	
75+	70.6	47.9	60.8	
<b>דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום<sup>(3)</sup></b>				
<b>סה"כ</b>	100.0	100.0	100.0	100.0
עייפות רבה	14.4	11.0	16.8	
עייפות מסויימת	39.4	37.5	39.8	
לא כל כך	16.5	18.0	15.5	
בכלל לא	29.7	33.5	27.9	
<b>דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום כלשהם במשך היום<sup>(3)</sup></b>				
<b>סה"כ</b>	70.3	66.5	72.1	
74-65	71.9	63.4	67.9	
75+	84.2	71.8	78.8	

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בחודש האחרון
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה
3. מתוך אלו שיש להם בעיות שינה

לוח 2.16: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2016

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	79-75	84-80	85+	האוכלוסייה כלל
<b>מספרים מוחלטים</b>							
סה"כ	16,421	4,609	3,569	3,310	2,436	2,497	30,181
גברים	8,373	2,369	1,900	1,781	1,219	1,104	13,751
נשים	8,048	2,240	1,669	1,529	1,217	1,393	16,430
<b>שיעורים ל-100,000 נפש</b>							
סה"כ	1,679	1,357	1,634	1,916	1,950	2,038	353
גברים סה"כ	1,931	1,490	1,883	2,359	2,340	2,395	325
מזה: קיבה	78	58	72	107	83	102	11
מעג גס וחלחולת	231	153	201	297	332	343	37
ריאה	261	204	262	342	311	269	41
ערמונית	334	328	406	419	232	176	48
שלפוחית השתן	214	153	191	253	288	325	31
לימפומה ממארת	96	75	89	119	132	102	21
ליקמיה	50	25	50	65	84	72	9
נשים סה"כ	1,478	1,240	1,420	1,571	1,672	1,823	381
מזה: קיבה	39	24	41	46	44	62	8
מעג גס וחלחולת	179	123	127	230	212	293	34
ריאה	122	94	128	140	154	128	22
שד	412	439	456	360	389	372	126
שחלה	31	31	32	29	34	29	8
שלפוחית השתן	37	16	44	51	34	59	6
לימפומה ממארת	82	68	88	97	95	75	20
ליקמיה	35	16	31	41	49	64	8

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

### לוח 2.17: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	2016	2015	2014	2012	2010	2006	
<b>גברים</b>							
סה"כ יהודים ואחרים*	1,953	2,006	2,045	2,195	2,287	2,309	
מזה: קיבה	79	74	82	84	91	91	
מעיי גס וחלחולת	233	248	258	305	307	379	
ריאה	247	242	245	227	252	231	
ערמונית	345	377	422	523	559	556	
שלפוחית השתן	211	222	234	243	239	236	
לימפומה ממארת	99	103	107	104	97	111	
ליקמיה	50	46	46	53	62	58	
סה"כ ערבים	1,698	1,628	1,618	1,961	2,286	2,062	
מזה: קיבה	61	37	69	70	57	101	
מעיי גס וחלחולת	203	210	225	266	305	229	
ריאה	409	401	381	388	449	392	
ערמונית	214	248	264	389	354	353	
שלפוחית השתן	243	193	165	195	255	309	
לימפומה ממארת	64	66	60	67	82	95	
ליקמיה	48	43	33	71	73	66	
<b>נשים</b>							
סה"כ יהודיות ואחרות*	1,518	1,562	1,497	1,505	1,578	1,468	
מזה: קיבה	39	39	36	33	47	47	
מעיי גס וחלחולת	183	198	194	184	222	243	
ריאה	127	126	130	110	111	85	
שד	423	442	365	408	394	343	
שחלה	31	41	37	36	36	40	
שלפוחית השתן	36	44	48	37	38	37	
לימפומה ממארת	84	86	83	71	67	76	
ליקמיה	35	34	24	34	31	31	
סה"כ ערביות	1,072	1,078	882	1,095	1,181	995	
מזה: קיבה	43	25	38	66	34	52	
מעיי גס וחלחולת	124	169	124	173	202	151	
ריאה	61	78	58	40	58	48	
שד	293	282	213	242	205	219	
שחלה	27						
שלפוחית השתן	45	29	11	27	12	18	
לימפומה ממארת	54						
ליקמיה	36						

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

\* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)



לוח 2.18: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2016

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	75+
<b>מספרים מוחלטים</b>				
<b>סה"כ יהודים בני 65+</b>	<b>14,570</b>	4,054	3,034	7,482
גברים	<b>7,364</b>	2,059	1,600	3,705
נשים	<b>7,206</b>	1,995	1,434	3,777
<b>שיעורים ל-100,000 נפש</b>				
<b>גברים</b>				
ילידי ישראל	<b>1,640</b>	1,212	1,862	2,245
ילידי אירופה-אמריקה	<b>2,254</b>	1,919	1,870	2,630
ילידי אסיה	<b>1,792</b>	1,224	1,817	2,108
ילידי אפריקה	<b>1,762</b>	1,333	1,812	2,079
<b>נשים</b>				
ילידות ישראל	<b>1,446</b>	1,176	1,666	1,708
ילידות אירופה-אמריקה	<b>1,727</b>	1,503	1,535	1,904
ילידות אסיה	<b>1,311</b>	1,105	1,205	1,455
ילידות אפריקה	<b>1,263</b>	1,132	1,173	1,407

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות

**לוח 2.19: הימצאות דמנציה<sup>(1)</sup> בקרב בני +45 לפי גיל ומין, 2016**

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>מספרים מוחלטים</b>			
54-45	321	153	168
64-55	1,963	1,037	926
74-65	7,560	3,927	3,933
84-75	25,124	9,162	15,962
85+	30,983	9,709	21,274
<b>סה"כ +65</b>	<b>63,667</b>	<b>22,798</b>	<b>41,169</b>
<b>שיעורים ל-100 נפש</b>			
54-45	0.0	0.0	0.0
64-55	0.3	0.3	0.2
74-65	1.4	1.4	1.3
84-75	8.4	7.1	9.3
85+	22.1	18.2	24.5
<b>סה"כ +65</b>	<b>6.4</b>	<b>5.3</b>	<b>7.4</b>
<b>שיעורים מתוקננים לגיל<sup>(2)</sup></b>			
בני 45 ומעלה	2.3	2.8	
בני 65 ומעלה	5.4	6.7	

מקור: נתונים שהתקבלו מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות. הדו"ח המלא בנושא יתפרסם בקרוב

1. הנתונים מבוססים על סקר שנערך בקרב מבוטחי ארבע קופות החולים. שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-25%-50%. בהתאם לכך, ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו במבוא
2. שיעורים מתוקננים לגיל מאפשרים להשוות בין קבוצות שהתפלגות הגיל שלהן שונה. השיעורים המתוקננים מציגים את הנתונים כאילו התפלגות הגיל בקבוצות אלו הייתה זהה. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל 2016

לוח 2.20: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2017

אחוזים, סוף שנה

להתלבש או להתרחץ			ללכת או לעלות במדרגות			סה"כ	סה"כ באלפים <sup>(1)</sup>	
יש	יש	אין קושי	יש	יש	אין קושי			
קושי רב <sup>(2)</sup>	קושי מועט	קושי	קושי רב <sup>(2)</sup>	קושי מועט	קושי			
12.6	12.2	75.3	30.2	17.1	52.7	100.0	962.9	סה"כ בני 65+
<b>גיל</b>								
7.1	8.7	84.1	21.4	16.6	62.0	100.0	595.6	בני 65-74
21.1	17.6	61.3	44.1	17.9	38.0	100.0	367.4	בני 75+
<b>מין</b>								
10.6	10.9	78.5	25.7	15.6	58.7	100.0	435.6	גברים
14.1	13.2	72.7	33.8	18.3	47.9	100.0	527.3	נשים
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>								
11.1	11.8	77.2	28.1	17.2	54.7	100.0	878.2	יהודים ואחרים מזה: עולי
14.3	18.2	67.4	35.9	25.3	38.8	100.0	170.7	בריחה"מ לשעבר
30.2	17.2	52.6	55.1	15.6	29.4	100.0	84.8	ערבים
לזכור או להתרכז			פעולות הקשורות למשק הבית <sup>(3)</sup>			סה"כ	סה"כ באלפים	
יש	יש	אין קושי	יש	יש	אין קושי			
קושי רב <sup>(2)</sup>	קושי מועט	קושי	קושי רב <sup>(2)</sup>	קושי מועט	קושי			
8.7	32.2	59.0	26.3	15.3	58.4	100.0	962.9	סה"כ בני 65+
<b>גיל</b>								
5.1	27.8	67.1	16.9	14.6	68.5	100.0	595.6	בני 65-74
14.5	39.2	46.4	41.1	16.4	42.5	100.0	367.4	בני 75+
<b>מין</b>								
7.4	31.2	61.4	21.4	13.2	65.4	100.0	435.6	גברים
9.8	33.1	57.2	30.2	17.0	52.8	100.0	527.3	נשים
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>								
7.8	31.9	60.2	23.9	15.4	60.7	100.0	878.2	יהודים ואחרים מזה: עולי
11.0	34.0	54.9	29.0	23.1	47.9	100.0	170.7	בריחה"מ לשעבר
19.5	35.6	45.0	53.8	14.2	32.0	100.0	84.8	ערבים

←

**לוח 2.20: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2017 (המשך)**

אחוזים, סוף שנה

מאפיינים	לשמוע <sup>(5)</sup>			לראות <sup>(4)</sup>			סה"כ	סה"כ באלפים <sup>(1)</sup>	
	יש קושי רב <sup>(2)</sup>	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב <sup>(2)</sup>	יש קושי מועט	אין קושי			
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>9.0</b>	<b>27.4</b>	<b>63.6</b>	<b>7.4</b>	<b>23.0</b>	<b>69.6</b>	<b>100.0</b>	<b>962.9</b>	
<b>גיל</b>									
בני 65-74	4.8	23.4	71.8	4.0	18.0	78.1	100.0	595.6	
בני 75+	15.6	33.8	50.6	12.8	31.1	56.1	100.0	367.4	
<b>מין</b>									
גברים	10.8	29.6	59.6	6.4	21.5	72.1	100.0	435.6	
נשים	7.6	25.7	66.8	8.2	24.3	67.5	100.0	527.3	
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>									
יהודים ואחרים	8.9	27.1	64.0	7.0	22.0	71.0	100.0	878.2	
מזה: עולי בריה"מ לשעבר	10.8	24.3	64.9	8.3	26.8	64.9	100.0	170.7	
ערבים	10.1	30.9	58.9	12.5	35.1	52.4	100.0	84.8	

מקור: למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנים 2015-2017

1. אוכלוסיית הסקר החברתי לשנת 2017.
2. כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד
3. כגון: נקיון, קניות וסידורים מחוץ לבית
4. גם כאשר מרכיב/ה משקפיים
5. גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה

**לוח 2.21: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2017**

מספרים מוחלטים

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
<b>בני 65+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>2,367</b>	<b>92</b>	<b>441</b>	<b>1,834</b>
גברים	1,300	56	216	1,028
נשים	1,067	36	225	806
<b>בני 65-74</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>1,453</b>	<b>28</b>	<b>226</b>	<b>1,199</b>
גברים	797	16	116	665
נשים	656	12	110	534
<b>בני 75+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>914</b>	<b>64</b>	<b>215</b>	<b>635</b>
גברים	503	40	100	363
נשים	411	24	115	272
<b>בני 65+ לפי מעמד הנפגע</b>				
הולך רגל	779	52	229	498
נהג רכב	994	29	102	863
נוסע ברכב	491	9	75	407
אחר	103	2	35	66
<b>בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*</b>				
יהודים	2,067	74	391	1,602
ערבים	230	14	36	180
<b>כלל האוכלוסייה</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>23,101</b>	<b>321</b>	<b>2,067</b>	<b>20,713</b>
גברים	13,576	237	1,416	11,923
נשים	9,525	84	651	8,790

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

\* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

**לוח 2.22: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2017**

שיעורים ל-100,000 נפש

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
<b>בני 65+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>237</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>184</b>
גברים	294	13	49	232
נשים	192	6	41	145
<b>בני 65-74</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>208</b>
גברים	297	6	43	248
נשים	213	4	36	174
<b>בני 75+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>217</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>150</b>
גברים	288	23	57	208
נשים	166	10	46	110
<b>בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*</b>				
יהודים	226	8	43	175
ערבים	275	17	43	215
<b>כלל האוכלוסייה</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>265</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>238</b>
גברים	314	5	33	276
נשים	217	2	15	200

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

\* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

**לוח 2.23: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות**

שיעורים ל-100,000 נפש

שנה	סה"כ נפגעים		מזה: הרוגים	
	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה
1985	378	442	24	9
1990	459	594	23	9
2001	219	584	12	8
2002	290	581	16	8
2003	273	554	12	7
2004	283	542	13	7
2005	277	512	12	6
2006	295	509	12	6
2007	278	457	11	6
2008	275	435	11	6
2009	249	425	8	4
2010	250	368	10	5
2011	253	349	8	4
2012	226	302	7	3
2013	249	301	6	3
2014	225	267	7	3
2015	234	264	11	4
2016	232	260	8	4
<b>2017</b>	<b>237</b>	<b>265</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

מקורות: למ"ס; משרד הבריאות

**לוח 2.24: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2017**

	חומרת התאונות			מאפיינים
	קלות	קשות	קטלניות	
<b>מספרים מוחלטים</b>				
<b>נהגים מעורבים בני 65+</b>	<b>1,979</b>	<b>321</b>	<b>57</b>	<b>2,357</b>
<b>גיל</b>				
בני 65-74	1,403	215	28	1,646
בני 75+	576	106	29	711
<b>מין</b>				
גברים	1,531	253	49	1,833
נשים	448	67	8	523
<b>כלל הנהגים המעורבים</b>				
סה"כ <sup>(1)</sup>	18,357	2,800	456	21,613
גברים	12,979	2,279	401	15,659
נשים	5,378	521	55	5,954
<b>שיעורים ל-10,000 נהגים<sup>(2)</sup></b>				
<b>נהגים מעורבים בני 65+</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>47</b>
גברים	49	8	2	59
נשים	24	4	0	28
<b>כלל הנהגים המעורבים</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>52</b>
גברים	55	10	2	66
נשים	29	3	0	33

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2016 ובסוף 2017



**לוח 2.25: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על ביצוע בדיקות רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 2017**

אחוזים

<sup>(1)</sup> מועד ביצוע הבדיקה האחרונה					עשו בדיקה	מאפיינים
סה"כ	מעל שנתיים	מעל שנה ועד שנתיים	בשנה אחרונה			
<b>בדיקת ממוגרפיה</b>						
100.0	28.4	31.0	40.6	<b>91.8</b>	נשים בנות +65	
100.0	21.7	31.6	46.7	<b>74.7</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>	
<b>בדיקת צוואר הרחם (PAP)</b>						
100.0	64.1	17.0	18.9	<b>52.4</b>	נשים בנות +65	
100.0	39.0	26.4	34.6	<b>62.2</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(3)</sup>	
<b>בדיקת דם סמוי</b>						
100.0	32.0	24.4	43.6	<b>71.8</b>	סה"כ בני 65+	
100.0	30.8	25.8	43.4	<b>74.0</b>	גברים	
100.0	33.1	23.2	43.8	<b>70.0</b>	נשים	
100.0	28.9	25.0	46.1	<b>52.1</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(4)</sup>	
<b>בדיקת קולונוסקופייה</b>						
100.0	59.4	20.9	19.7	<b>57.9</b>	סה"כ בני 65+	
100.0	59.4	22.0	18.6	<b>60.4</b>	גברים	
100.0	59.5	19.8	20.7	<b>55.8</b>	נשים	
100.0	55.2	22.1	22.7	<b>39.0</b>	כלל האוכלוסייה <sup>(4)</sup>	

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. מתוך אלה שעשו את הבדיקה
2. לנשים בנות 40 ומעלה
3. לנשים בנות 25 ומעלה
4. לבני 40 ומעלה

לוח 2.26: בני 65+ וכלל האוכלוסייה\* אשר קיבלו חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין, 2017

			אחוזים
נשים	גברים	סה"כ	מאפיינים
59.3	62.7	60.8	סה"כ בני 65+
			גיל
57.1	59.5	58.2	בני 65-74
62.6	68.3	65.1	בני 75+
26.8	24.3	25.6	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, הסקר החברתי  
\* בני 20 ומעלה

**לוח 2.27: ביקורים וביקורים חוזרים של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה<sup>(1)</sup>, לפי גיל ומין, 2017**

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
<b>מספר ביקורים<sup>(2)</sup> (באלפים)</b>			
סה"כ בני 65+ גיל	581.3	272.9	308.4
בני 65-74 גיל	241.1	123.0	118.1
בני 75-84 גיל	209.5	96.4	113.1
בני 85+ גיל	130.7	53.6	77.1
כלל האוכלוסייה	2,613.6	1,359.1	1,254.5
<b>אחוז הביקורים של בני 65+ מתוך כלל הביקורים</b>	<b>22.2</b>	<b>20.1</b>	<b>24.6</b>
<b>שיעורים לאלף נפש</b>			
סה"כ בני 65+ גיל	571.1	603.9	544.9
בני 65-74 גיל	418.7	456.7	385.4
בני 75-84 גיל	703.1	746.7	670.3
בני 85+ גיל	1,053.5	1,152.9	993.7
כלל האוכלוסייה	297.4	314.3	281.4
<b>ביקורים חוזרים<sup>(3)</sup> בתוך 30 ימים (אחוזים)</b>			
סה"כ בני 65+ גיל	22.2	23.8	20.8
בני 65-74 גיל	20.9	22.4	19.5
בני 75-84 גיל	22.8	24.7	21.3
בני 85+ גיל	23.5	25.4	22.2
כלל האוכלוסייה	17.3	17.2	17.3

מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - מאפייני הפעילות 2017" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 29 בתי חולים לאשפוז כללי ללא בתי החולים במזרח ירושלים. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

**לוח 2.28: אשפוזים\* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי, לפי מין וגיל, שנים נבחרות**

שיעורים ל-1,000 נפש

מאפיינים	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2000
<b>בני 65+</b>								
סה"כ	415	422	433	437	445	464	497	494
גברים	472	478	491	493	503	524	560	570
נשים	370	377	388	393	400	418	449	437
<b>בני 65-74</b>								
סה"כ	304	308	315	318	327	341	370	397
גברים	361	364	372	375	385	403	435	468
נשים	255	258	265	269	277	289	316	342
<b>בני 75+</b>								
סה"כ	566	570	581	579	584	605	636	617
גברים	644	646	658	651	659	681	715	710
נשים	512	517	526	528	532	552	581	553
<b>בני 75-84</b>								
סה"כ	504	510	518	519	530	548	581	569
גברים	583	588	600	593	606	628	660	661
נשים	446	452	458	464	473	491	525	503
<b>בני 85+</b>								
סה"כ	716	715	733	727	720	746	775	770
גברים	813	808	822	816	810	833	872	877
נשים	657	660	680	674	667	694	718	703
<b>כלל האוכלוסייה</b>								
סה"כ	134	136	138	138	140	142	148	144
גברים	130	131	133	133	135	137	143	142
נשים	138	140	142	143	145	147	153	146

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות  
 \* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

**לוח 2.29: אשפוזים\* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות**

								אחוזים
								מאפיינים
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2000	
								<b>בני 65+</b>
<b>35.4</b>	<b>34.9</b>	<b>34.5</b>	<b>34.0</b>	<b>33.5</b>	<b>33.6</b>	<b>33.3</b>	<b>34.1</b>	<b>סה"כ</b>
37.2	36.5	36.0	35.2	34.7	34.6	33.8	34.0	גברים
33.8	33.4	33.1	32.8	32.4	32.6	32.9	34.1	נשים
								<b>בני 75+</b>
20.5	20.5	20.6	20.5	20.2	20.4	20.3	18.8	סה"כ
20.0	20.0	20.1	19.8	19.5	19.6	19.3	18.0	גברים
20.9	21.0	21.1	21.1	20.9	21.1	21.3	19.6	נשים
								<b>בני 85+</b>
7.6	7.5	7.5	7.4	7.1	7.2	6.9	5.7	סה"כ
6.7	6.6	6.6	6.5	6.3	6.3	6.1	5.1	גברים
8.4	8.3	8.4	8.2	7.9	8.0	7.7	6.3	נשים

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

\* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.30: בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות\*, שנים נבחרות

אחוזים

מחלקה	2000	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>כלל המחלקות הכלליות</b>	<b>34.1</b>	<b>33.3</b>	<b>33.6</b>	<b>33.5</b>	<b>34.0</b>	<b>34.5</b>	<b>34.9</b>	<b>35.4</b>
פנימית	58.0	58.9	60.2	60.1	60.7	61.5	61.9	62.9
ריאות	46.1	47.6	49.5	50.9	52.8	51.8	51.8	52.6
גריאטרייה חריפה	96.1	95.8	96.5	98.8	98.5	98.5	99.1	99.0
נירולוגיה	33.9	32.1	33.8	34.8	35.4	36.1	37.1	37.7
אונקולוגיה	37.9	38.3	40.6	40.5	41.6	43.6	46.5	47.6
עור ומין	32.1	32.1	33.2	32.9	35.7	37.8	38.6	41.7
השתלת מוח עצם	3.6	8.5	15.0	16.0	15.7	15.7	15.1	19.0
טיפול נמרץ כללי	47.6	48.3	48.5	47.7	47.7	49.4	48.0	49.8
טיפול נמרץ לב	50.4	49.4	50.7	50.9	51.3	52.5	53.6	54.3
טיפול נמרץ נשימתי	73.9	64.4	62.9	57.8	57.4	61.1	59.3	59.0
כירורגייה כללית	27.2	27.2	26.6	27.0	27.6	28.8	29.8	30.6
אורתופדיה	32.4	34.7	35.7	35.6	36.0	36.8	36.8	37.7
אורולוגיה	40.3	37.9	39.9	40.6	40.5	41.3	42.4	43.6
נירוכירורגייה	28.8	33.6	35.0	34.5	36.3	37.0	37.0	38.3
כירורגייה חזה ולב	47.4	47.5	48.4	48.2	47.6	48.0	49.0	50.9
כירורגייה כלי דם	55.8	53.4	55.4	54.0	53.5	55.7	56.1	58.0
כירורגייה פלסטית	28.1	28.1	26.3	26.7	26.3	26.9	27.0	29.5
עיניים	58.4	60.8	59.1	59.2	58.1	57.4	57.7	58.3
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	11.9	13.0	13.3	14.5	14.0	14.4	14.5	15.9
פה ולסת	11.6	10.9	11.9	13.5	12.9	11.3	13.2	13.5
נשים	3.9	3.2	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	3.9
השהיה	36.2	34.4	31.9	28.9	29.6	28.5	26.6	27.9

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

\* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכלל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.31: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2017

			אחוזים
מחלקה	סה"כ	גברים	נשים
<b>כלל המחלקות הכלליות*</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
פנימית	45.2	44.2	46.2
ריאות	0.3	0.4	0.3
גריאטרייה חריפה	3.8	3.0	4.6
נירולוגיה	2.0	2.1	1.9
אונקולוגיה	1.3	1.5	1.2
עור ומין	0.5	0.6	0.5
השתלת מוח עצם	0.1	0.1	0.1
טיפול נמרץ כללי	2.1	2.3	1.9
טיפול נמרץ לב	4.0	4.9	3.0
טיפול נמרץ נשימתי	0.2	0.2	0.2
כירורגייה כללית	15.4	15.9	14.9
אורתופדיה	5.9	4.3	7.5
אורולוגיה	3.8	6.0	1.5
נירוכירורגייה	1.1	1.2	1.0
כירורגייה חזה ולב	1.6	1.9	1.2
כירורגייה כלי דם	1.2	1.7	0.8
כירורגייה פלסטית	0.6	0.7	0.6
עיניים	3.6	3.4	3.7
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	1.1	1.2	1.0
פה ולסת	0.1	0.1	0.1
נשים	1.0	0.0	2.1
השהיה	5.0	4.4	5.6

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

\* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.32: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2017

ימים

מחלקה	כלל האוכלוסייה		בני 65+		סה"כ
	נשים	גברים	נשים	גברים	
<b>כלל המחלקות הכלליות*</b>	3.8	4.2	4.0	5.3	5.1
פנימית	4.7	4.6	4.6	5.1	5.0
ריאות	4.4	4.3	4.3	4.7	4.3
גריאטרייה חריפה	11.4	11.1	11.3	11.3	11.0
נירולוגיה	5.0	5.1	5.1	6.3	6.1
אונקולוגיה	6.8	6.1	6.4	7.3	6.4
עור ומין	6.4	6.8	6.6	7.2	6.8
השתלת מוח עצם	17.4	17.8	17.7	17.4	15.2
טיפול נמרץ כללי	5.6	6.0	5.9	6.3	6.3
טיפול נמרץ לב	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8
טיפול נמרץ נשימתי	2.7	2.9	2.8	3.1	3.0
כירורגייה כללית	2.6	2.6	2.6	3.7	3.4
אורתופדיה	5.0	4.5	4.7	6.1	6.3
אורולוגיה	3.2	3.2	3.2	3.6	3.7
נירוכירורגייה	5.8	6.2	6.0	6.6	6.6
כירורגייה חזה ולב	5.9	6.2	6.1	6.0	6.3
כירורגייה כלי דם	4.2	4.7	4.5	5.1	4.8
כירורגייה פלסטית	4.1	5.4	4.7	4.5	4.1
עיניים	1.9	2.1	2.0	1.7	1.8
אף-אוזן-גרון					
וכירורגייה ראש וצוואר	2.7	2.7	2.7	3.6	3.9
פה ולסת	3.4	3.6	3.5	4.7	4.5
נשים	2.1	1.2	2.1	3.4	1.0
השהיה	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

\* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים



**לוח 2.33: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המטופלים\* בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי במרפאות ממשלתיות, 2017**

סוף שנה

סה"כ	
<b>מספרים מוחלטים</b>	
<b>מטופלים בני 65+</b>	<b>5,341</b>
מטופלים בכלל האוכלוסייה	43,736
<b>אחוזים</b>	
בני 65+ מכלל המטופלים	12.2
מטופלים בני 65+ מכלל בני 65+	0.5
כלל המטופלים מתוך האוכלוסייה	0.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה \* אנשים שהיה להם לפחות מגע אחד בתקופה הנתונה

**לוח 2.34: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2017**

מספרים מוחלטים, סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
<b>בני 65+</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
בני 65-74	16	6	10
בני 75-84	1	0	1
בני 85+	0	0	0
כלל האוכלוסייה	222	125	97

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.35: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2017

סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
<b>מספרים מוחלטים</b>			
<b>כלל בני 65+</b>	<b>345</b>	<b>173</b>	<b>172</b>
בני 65-74	266	145	121
בני 75-84	67	22	45
בני 85+	12	6	6
כלל האוכלוסייה	3,404	2,225	1,179
<b>שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה</b>			
<b>כלל בני 65+</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>
בני 65-74	0.4	0.5	0.4
בני 75-84	0.2	0.2	0.3
בני 85+	0.1	0.1	0.1
כלל האוכלוסייה	0.4	0.5	0.3

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.36: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	1990	2000	2009	2015	2016	2017
<b>כלל בני 65+</b>						
סה"כ	3.5	1.5	0.4	0.4	0.4	0.3
גברים	3.1	1.4	0.4	0.4	0.5	0.4
נשים	3.9	1.5	0.3	0.3	0.4	0.3
<b>בני 65-74</b>						
סה"כ	3.6	1.7	0.5	0.5	0.4	0.4
גברים	3.7	1.7	0.5	0.6	0.5	0.5
נשים	3.5	1.6	0.5	0.4	0.4	0.4
<b>בני 75-84</b>						
סה"כ	3.6	1.3	0.3	0.2	0.3	0.2
גברים	2.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2
נשים	4.5	1.5	0.3	0.3	0.4	0.3
<b>בני 85+</b>						
סה"כ	3.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
גברים	1.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1
נשים	4.0	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>כלל האוכלוסייה</b>						
סה"כ	1.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4
גברים	2.1	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5
נשים	1.5	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.37: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

מאפיינים	1990	2000	2010	2015	2016	2017
<b>כלל בני 65+</b>						
סה"כ	1,412	1,867	1,645	1,949	2,132	2,072
גברים	526	641	758	913	1,012	955
נשים	886	1,226	887	1,036	1,120	1,117
<b>בני 65-74</b>						
סה"כ	892	1,117	1,005	1,287	1,427	1,426
גברים	321	408	497	636	734	707
נשים	571	709	508	651	693	719
<b>בני 75-84</b>						
סה"כ	467	621	540	539	586	535
גברים	181	186	214	221	222	199
נשים	286	435	326	318	364	336
<b>בני 85+</b>						
סה"כ	53	129	100	123	119	111
גברים	24	47	47	56	56	49
נשים	29	82	53	67	63	62
<b>כלל האוכלוסייה</b>						
סה"כ	12,262	18,172	20,918	22,515	23,379	23,882
גברים	6,788	10,632	13,095	13,999	14,399	14,675
נשים	5,474	7,540	7,823	8,516	8,980	9,207

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.38: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2017

כלל האוכלוסייה	בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	אבחנה
<b>מספרים מוחלטים</b>					
<b>סה"כ קבלות</b>					
23,882	111	535	1,426	2,072	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
11,671	9	140	662	811	הפרעות פסיכוטיות חריפות
2,011	15	42	62	119	הפרעות אפקטיביות
3,977	36	219	504	759	הפרעות אורגניות
656	41	73	67	181	הפרעות נירוטיות
1,739	4	30	64	98	הפרעות אישיות
1,048	1	5	19	25	הפרעות בגיל הילדות
435				0	סמים ואלכוהול
796			7	7	פיגור שכלי
93				0	גורמי פנייה אחרים
1,432	4	26	41	71	לא ידוע
24	1			1	
<b>אחוזים</b>					
<b>סה"כ קבלות</b>					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
48.9	8.1	26.2	46.4	39.1	הפרעות פסיכוטיות חריפות
8.4	13.5	7.9	4.3	5.7	הפרעות אפקטיביות
16.7	32.4	40.9	35.3	36.6	הפרעות אורגניות
2.7	36.9	13.6	4.7	8.7	הפרעות נירוטיות
7.3	3.6	5.6	4.5	4.7	הפרעות אישיות
4.4	0.9	0.9	1.3	1.2	הפרעות בגיל הילדות
1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	סמים ואלכוהול
3.3	0.0	0.0	0.5	0.3	פיגור שכלי
0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	גורמי פנייה אחרים
6.0	3.6	4.9	2.9	3.4	לא ידוע
0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.39: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2017

גיל	סה"כ	גברים	נשים
<b>מספרים מוחלטים</b>			
<b>כלל בני 65+</b>	<b>530</b>	<b>238</b>	<b>292</b>
בני 65-74	264	130	134
בני 75-84	192	71	121
בני 85+	74	37	37
כלל האוכלוסייה	5,071	3,003	2,068
<b>שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה</b>			
<b>כלל בני 65+</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
בני 65-74	0.4	0.5	0.4
בני 75-84	0.6	0.6	0.7
בני 85+	0.6	0.8	0.5
כלל האוכלוסייה	0.6	0.7	0.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.40: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

					מאפיינים				
					בני 65+	בני 74-65	בני 84-75	בני 85+	כלל האוכלוסייה
<b>נובמבר 2010</b>									
					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סה"כ									
					66.0	62.1	69.3	73.1	52.5
שירותי בריאות כללית									
					18.8	21.4	16.7	14.1	24.7
מכבי שירותי בריאות									
					7.4	7.6	7.3	6.8	9.2
קופת חולים לאומית									
					7.8	8.9	6.7	6.0	13.6
קופת חולים מאוחדת									
<b>נובמבר 2015</b>									
					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סה"כ									
					61.1	57.8	63.4	70.2	52.3
שירותי בריאות כללית									
					22.2	24.4	20.9	16.2	25.2
מכבי שירותי בריאות									
					7.4	7.5	7.4	6.8	8.7
קופת חולים לאומית									
					9.3	10.4	8.3	6.8	13.8
קופת חולים מאוחדת									
<b>נובמבר 2016</b>									
					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סה"כ									
					60.4	57.3	62.4	69.6	52.2
שירותי בריאות כללית									
					22.8	24.7	21.7	16.7	25.4
מכבי שירותי בריאות									
					7.3	7.4	7.3	6.7	8.5
קופת חולים לאומית									
					9.5	10.5	8.6	7.0	13.9
קופת חולים מאוחדת									
<b>נובמבר 2017</b>									
					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סה"כ									
					59.8	56.7	61.8	69.1	52.1
שירותי בריאות כללית									
					23.4	25.3	22.2	17.2	25.7
מכבי שירותי בריאות									
					7.2	7.4	7.2	6.6	8.3
קופת חולים לאומית									
					9.6	10.6	8.8	7.1	13.9
קופת חולים מאוחדת									

מקור: המוסד לביטוח לאומי

### לוח 2.41: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, 1994-2017

אחוזים

מועד	סה"כ	שירותי בריאות כללית	מכבי שירותי בריאות	קופת חולים לאומית	קופת חולים מאוחדת
דצמבר 1994	10.2	13.1	4.9	7.2	4.1
דצמבר 1995	10.1	12.9	5.1	7.4	4.4
נובמבר 1996	10.0	13.0	5.2	7.3	4.4
נובמבר 1997	10.1	13.2	5.4	7.2	4.4
נובמבר 1998	10.0	13.2	5.5	7.4	4.6
נובמבר 1999	10.0	13.1	5.6	7.4	4.7
נובמבר 2000	10.0	13.1	5.8	7.5	4.8
נובמבר 2001	10.0	13.1	6.0	7.5	5.0
נובמבר 2002	10.1	13.1	6.3	7.7	5.2
נובמבר 2003	10.2	13.2	6.6	7.9	5.3
נובמבר 2004	10.2	13.2	6.8	8.0	5.4
נובמבר 2005	10.2	13.1	7.0	7.9	5.5
נובמבר 2006	10.4	13.2	7.3	8.0	5.8
נובמבר 2007	10.1	12.9	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2008	10.1	12.8	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2009	10.1	12.8	7.5	8.1	5.6
נובמבר 2010	10.2	12.8	7.7	8.2	5.8
נובמבר 2011	10.0	12.6	7.6	8.2	5.8
נובמבר 2012	10.7	13.0	8.7	8.7	6.7
נובמבר 2013	10.9	13.1	9.2	9.1	7.0
נובמבר 2014	11.1	13.1	9.7	9.2	7.3
נובמבר 2015	11.4	13.3	10.1	9.6	7.7
נובמבר 2016	11.7	13.5	10.5	10.1	8.0
<b>נובמבר 2017</b>	<b>11.9</b>	<b>13.7</b>	<b>10.8</b>	<b>10.4</b>	<b>8.3</b>

מקור: המוסד לביטוח לאומי



